

Приложение 1
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
17.05.2018 № 42

Национальный календарь профилактических прививок

№ п/п	Перечень инфекций, против которых проводятся профилактические прививки	Группы физических лиц, подлежащих профилактическим прививкам, и сроки проведения профилактических прививок
1	Вирусный гепатит В	Новорожденные в первые 12 часов жизни, дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев
2	Туберкулез	Новорожденные на 3–5-й день жизни
3	Пневмококковая инфекция	<p>Дети в возрасте 2, 4 и 12 месяцев, имеющие одно из следующих заболеваний или состояний:</p> <p>иммунодефицитные состояния (ВИЧ-инфекция, хроническая почечная недостаточность, нефротический синдром, хронический гепатит, цирроз печени, заболевания, связанные с назначением иммуносупрессивной терапии или лучевой терапии, злокачественные новообразования, лейкозы, лимфомы, болезнь Ходжкина, после трансплантации донорского органа, врожденный иммунодефицит, функциональная или анатомическая аспления (серповидно-клеточная анемия, другие гемоглобинопатии, врожденная или приобретенная аспления);</p> <p>рецидивирующий острый гнойный средний отит (более 3 эпизодов в течение года);</p> <p>рецидивирующие пневмонии;</p> <p>бронхолегочная дисплазия, врожденные пороки дыхательных путей, первичная цилиарная дискинезия, дефицит α1-антитрипсина;</p> <p>пороки сердца, требующие гемодинамической коррекции и с обогащением малого круга кровообращения;</p> <p>наличие кохлеарного имплантата или планирование проведения данной операции;</p> <p>сахарный диабет;</p> <p>бронхиальная астма</p> <p>Дети других возрастов до достижения ими возраста 5 лет в соответствии с инструкцией по медицинскому применению, прилагаемой к иммунобиологическому лекарственному средству, и имеющие одно из заболеваний или состояний, указанных в настоящем пункте</p>
4	Дифтерия, столбняк, коклюш, гемофильная инфекция	Дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев
5	Гемофильная инфекция	<p>Дети, ранее не получившие профилактические прививки против гемофильной инфекции, до достижения ими возраста 5 лет в соответствии с инструкцией по медицинскому применению, прилагаемой к иммунобиологическому лекарственному средству, и имеющие одно из следующих заболеваний или состояний:</p> <p>хронический гепатит;</p> <p>цирроз печени;</p> <p>хронические заболевания почек, сердца и легких;</p> <p>иммунодефицитные состояния;</p> <p>муковисцидоз</p>

6	Дифтерия, столбняк, коклюш	Дети в возрасте 18 месяцев
7	Полиомиелит	Дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев и 7 лет
8	Корь, эпидемический паротит, краснуха	Дети в возрасте 12 месяцев и 6 лет
9	Дифтерия и столбняк	Дети в возрасте 6 лет, 16 лет, взрослые в возрасте 26 лет и каждые последующие 10 лет жизни до достижения возраста 66 лет
10	Дифтерия	Дети в возрасте 11 лет
11	Грипп	<p>Дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет</p> <p>Дети в возрасте от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями</p> <p>Лица с иммуносупрессией</p> <p>Лица в возрасте старше 65 лет</p> <p>Беременные женщины</p> <p>Медицинские, фармацевтические работники</p> <p>Дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания</p> <p>Работники государственных органов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения</p>